

Les oiseaux de Clairefontaine

L'avifaune originale de Clairefontaine est représentée par des espèces rupestres inféodées aux falaises calcaires orientées au Sud renvoyant lumière et chaleur.

Dans l'environnement immédiat de cet espace vertical on trouve aussi le cortège des espèces forestières de moyenne montagne. Les oiseaux des milieux agricoles à l'abandon profitent, depuis quelques décennies, de l'embroussaillage des vignes et des pairies. A ce rythme la couverture sylvestre recouvrira piémont et ouvertures.

Le promeneur attentif aux manifestations animales remarquera en regard des falaises et des éboulis la présence du Martinet à ventre blanc, de l'Hirondelle de rocher, du Bruant fou et du Faucon pèlerin. Il trouvera un peu plus bas la Pie-grièche écorcheur, l'Hypolaïs polyglotte.

En savoir plus :

La partie la plus ensoleillée de Clairefontaine, propice aux reptiles, est fréquentée, dès les beaux jours et jusqu'au début de l'automne, par le Circaète Jean le Blanc qui étend sa zone de chasse sur les coteaux et les plats des roches. Cet Aigle migrateur et mangeur de serpents dont le domaine vital s'étend naturellement sur plusieurs milliers d'hectares recherche les zones non boisées. Il se trouve donc mis en danger par cette progression forestière qui dévore nombre de milieux de notre pays. Certes le Geai des chênes, la Fauvette à tête noire, la Grive musicienne tirent leur épingle du jeu mais Clairefontaine n'échappe pas à cette mutation générale des espaces. Les photographies « anciennes » d'une cinquantaine d'années - ce qui n'est rien - en témoignent. Pour combien de temps encore Clairefontaine montrera ce paysage à la physionomie intéressante et multiple où la biodiversité peut encore s'exprimer dans ses différentes composantes. Nature en danger par son propre développement, la forêt recèle des richesses en en faisant disparaître d'autres.

Liste des espèces observées :

<i>Accipiter nisus</i>	Epervier d'Europe
<i>Aegithalos caudatus</i>	Mésange à longue queue
<i>Anas platyrhynchos</i>	Canard col vert
<i>Apus apus</i>	Martinet noir
<i>Apus melba</i>	Martinet à ventre blanc
<i>Buteo buteo</i>	Buse variable
<i>Circaetus gallicus</i>	Circaète Jean le Blanc
<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Grosbec casse-noyaux
<i>Colomba palumbus</i>	Pigeon ramier
<i>Corvus corax</i>	Grand corbeau
<i>Cuculus canorus</i>	Coucou gris
<i>Delichon urbica</i>	Hirondelle de fenêtre
<i>Dendrocopos minor</i>	Pic épeichette
<i>Emberiza cia</i>	Bruant fou
<i>Emberiza cirius</i>	Bruant zizi

<i>Erithacus rubecula</i>	Rougegorge familier
<i>Falco peregrinus</i>	Faucon pèlerin
<i>Fringilla coelebs</i>	Pinson des arbres
<i>Garrulus glandarius</i>	Geai des chênes
<i>Hippolais polyglotta</i>	Hypolaïs polyglotte
<i>Lanius collurio</i>	Pie grièche écorcheur
<i>Milvus migrans</i>	Milan noir
<i>Motacilla alba</i>	Bergeronnette grise
<i>Motacilla cinerea</i>	Bergeronnette des ruisseaux
<i>Parus ater</i>	Mésange noire
<i>Parus caeruleus</i>	Mésange bleue
<i>Parus major</i>	Mésange charbonnière
<i>Parus palustris</i>	Mésange nonette
<i>Pernis apivorus</i>	Bondrée apivore
<i>Phoenicurus ochruros</i>	Rougequeue noir
<i>Phylloscopus bonelli</i>	Pouillot de Bonelli
<i>Phylloscopus collybita</i>	Pouillot véloce
<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	Pouillot siffleur
<i>Phylloscopus trochilus</i>	Pouillot fitis
<i>Picus viridis</i>	Pic vert
<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	Hirondelle de rocher
<i>Regulus ignicapillus</i>	Roitelet triple-bandeau
<i>Saxicola torquata</i>	Tarier pâtre
<i>Sitta europa</i>	Sitelle torchepot
<i>Sylvia atricapilla</i>	Fauvette à tête noire
<i>Sylvia borin</i>	Fauvette des jardins
<i>Sylvia communis</i>	Fauvette grisette
<i>Troglodytes troglodytes</i>	Troglodyte mignon
<i>Turdus merula</i>	Merle noir
<i>Turdus philomelos</i>	Grive musicienne
<i>Turdus viscivorus</i>	Grive draine